

8327 Davis Street
Suite 101
Downey, CA 90241
562 904-6027



3737 Martin Luther King, Jr Blvd
Suite 401
Lynwood, CA 90262
310 604-0443

CardioMedicalConsultants.com

Amin Farah, M.D., FACC

Jamie Weiss, M.D., FACC

Tanvir Hussain, M.D.

INSTRUCCIONES DE DESCARGA: CATETERISMO CARDÍACO

Es necesario que un adulto con usted para las próximas 24 horas. No puede beber alcohol, conducir un coche u operar cualquier maquinaria pesada para las próximas 24 horas.

Actividad

Después de salir del hospital, debe descansar lo más posible durante 24 horas, de pie y caminar sólo cuando sea necesario (i.e. going al baño). Evitar levantar cosas pesadas y el ejercicio por 7 – 10 días y minimizar escaleras.

Medicamentos

Tomar como lo indique su médico.

Dieta

Reanudar su dieta anterior, excepto cuando se especifique lo contrario por su médico. Si NO tiene insuficiencia cardíaca congestiva, beber líquidos adicionales durante las próximas 12 horas (hasta 2-3 cuartos de galón de agua o jugo). No tome bebidas alcohólicas durante 24 horas después de su procedimiento.

Cuidado de heridas / higiene

Se puede duchar tan pronto como usted desea. No frote el sitio, lave suavemente y séquelo.

Actividad sexual

Abstenerse de tener relaciones sexuales durante las próximas 48 horas.

Llame si usted tiene cualquiera de los siguientes

Dificultad para respirar o para tragar, dolor en el pecho o retorno de los síntomas del corazón; prolongado vómito dura más de 12 horas y no lo que le permite reanudar sus medicamentos o dieta regular; dolor de cabeza severo no se alivia por Tylenol; enrojecimiento, dolor importante o hinchazón en el sitio IV o procedimiento; cualquier preguntas o inquietudes.

Instrucciones adicionales

Si usted nota cualquier signo de sangrado (empapando a través de la venda, abultamiento debajo de la piel o dolor aumento localizado), aplique presión directa en el área, llame a su médico y acudir a la sala de emergencia para la evaluación.

Cualquier persona que se somete a un procedimiento y recibe un medicamento liberador de stent DEBE permanecer en Plavix / Prasugrel / Brillinta por un mínimo de 3 a 12 meses y aspirin 81mg diarios para toda la vida. No deje estos medicamentos por alguna razón a menos que despejó con su cardiólogo.