

8327 Davis Street
Suite 101
Downey, CA 90241
562 904-6027



3737 Martin Luther King, Jr Blvd
Suite 401
Lynwood, CA 90262
310 604-0443

CardioMedicalConsultants.com

Amin Farah, M.D., FACC

Jamie Weiss, M.D., FACC

Tanvir Hussain, M.D.

MARCAPASOS/IMPLANTABLE DEFIBRILLATOR CARDIACO (ICD) INSTRUCCIONES

Previsto procedimiento: Marcapasos Desfibrilador Cardiaco Implantado

Fecha de procedimiento: _____ Tiempo: _____ A.M.

Programación procedimiento médico: Dr. Amin Farah Dr. Douglas Segal
 Dr. Jamie Weiss Dr. Thomas Brodie

Localización del procedimiento: Saint Francis Medical Center PIH Health Downey Hospital

Instrucciones de procedimiento previo:

- ❖ Por favor, hacer arreglos para que alguien llevarlo al hospital y a casa después de conducir el procedimiento es típicamente limitado durante al menos 1 semana después de la implantación del dispositivo **Usted no puede conducir después del procedimiento.**
- ❖ NO COMA o BEBA nada DESPUÉS de MEDIANOCHE la noche antes de la prueba.
- ❖ Por favor, llegar al hospital "ayunando" (qué comer) desde la medianoche anterior
- ❖ Usted puede tomar sus medicamentos de la mañana con un pequeño sorbo de agua
- ❖ Si usted ordena que saquen sangre, no olvide (puede ser instruidos para esto varios días antes del procedimiento)
- ❖ Por favor asegúrese de haber consultado con su médico si usted está en un *diluyente de la sangre* o la *insulina* para la diabetes. Para la mayoría de los procedimientos, su *sangre* será parado 2 días antes. **Si toma Coumadin (warfarina) o aspirina y luego dejas 7 días previa.**
- ❖ Si no ha recibido una llamada telefónica desde el hospital o en nuestra oficina el día antes del procedimiento para hacerle saber a qué hora llegar, comuníquese con nosotros.
- ❖ Si desarrollar un resfriado o están enfermos, por favor consulte a su médico inmediatamente como es posible que debemos posponer su procedimiento.

El día del procedimiento

- ❖ Por favor, llegar a la hora especificados con anterioridad para permitir suficiente tiempo para registro de hospital y check-in, por favor llame si usted será tarde.
- ❖ Traer su remisión con usted al hospital. Traiga sus medicamentos (o una lista) al hospital.
- ❖ Por favor traiga cualquier documentación adicional que ha solicitado su médico.
- ❖ Confirmar con su médico acerca de sus instrucciones específicas con *coumadin* y la *insulina* si usted tiene diabetes.

- ❖ Por favor no use lentes de contacto
- ❖ Si usted puede evitar, por favor no usar o traer joyas, relojes o dinero el día de su procedimiento de
- ❖ No dude en traer su propio cepillo de dientes, albornoz, cepillo para el pelo y accesorios para tu noche de hospital
- ❖ Su médico discutirá el procedimiento otra vez con usted mañana. Por favor traiga una lista de preguntas si tienes alguna después de su discusión de la oficina. También se le pedirá firmar un consentimiento informado mañana.
- ❖ Después del procedimiento, usted tendrá un cabestrillo para el brazo por lo general 24 horas.
- ❖ Esperar una estancia hospitalaria durante la noche, con un examen de mañana para el dispositivo y la incisión sitio son apropiados.
- ❖ Por favor, hacer arreglos para que alguien llevarlo al hospital y a casa después de conducir el procedimiento es típicamente limitado durante al menos 1 semana después de la implantación del dispositivo

Descarga las instrucciones y cuidados

- ❖ Su médico discutirá recomendaciones individualizadas específicas en la atención de su descarga. Las siguientes son recomendaciones generales:
- ❖ Apósito seco una vez al día cambia a la zona de la incisión. Lavarse las manos, quitar el apósito viejo y luego cubrir la incisión con una nueva gasa de 4 X 4 doblada y la cinta de papel. Si usted tiene steri-strips, por favor, no eliminarlos. Estas tiritas se eliminarán en su dispositivo la cita de verificación de seguimiento de la herida 1 semana.
- ❖ Se le pedirá para mantener el sitio de la incisión seca durante la semana después de la implantación (puede ducharse, pero necesita mantener seco el sitio afectado).
- ❖ Conducir normalmente se desaconseja durante al menos 1 semana o más después de que el dispositivo se implanta
- ❖ Levantar cosas pesadas de límite con el brazo implicado durante al menos 4 semanas
- ❖ Extrema movimiento con el brazo implicado (por encima del hombro) debe evitarse durante 4-6 semanas después de la implantación del dispositivo (esto incluye actividades como la natación y el golf), esto podría resultar en el desprendimiento del plomo.
- ❖ Tendrá que regresar a la clínica en una semana después de la implantación del dispositivo para comprobar la cicatrización de la incisión de.
- ❖ Usted puede volver a sus actividades normales dentro de varios días
- ❖ Hablar con su médico sobre sus medicamentos después de la implantación del dispositivo, incluso cuando retomar sangre disolvente.
- ❖ Esperar 3-5 días de antibióticos orales para pacientes ambulatorios después de la implantación del dispositivo
- ❖ Notifique a su médico si tiene sangrado, hinchazón, descarga, fiebre, dificultad para respirar, incomodidad extrema o para cualquier otra inquietud sobre el sitio del procedimiento.

Ubicaciones:

- ❖ San Francisco Medical Center: 3630 east Imperial Highway, Lynwood, CA 90262
- ❖ PIH salud Downey Hospital: 11500 Brookshire Ave, Downey, CA 90241

Gracias por su tiempo y cooperación.